

## Medici, direttore del dipartimento di staff (?) direttore generale, assessore alla sanità: ma non sono tutti pagati da noi contribuenti?

da una comunicazione a un organo di controllo:

..... vi fornisco questo documento su uno dei numerosi soprusi subiti da mio figlio, e anche da me, da parte di medici e istituzioni sanitarie.


Io chiedevo semplicemente la correzione dei farmaci assolutamente sbagliati; mi viene rifiutata (ho evitato di segnalare al Piccolo quante telefonate e quali risposte seccate) senza il minimo senso di responsabilità. Il Piccolo mi pubblica la segnalazione. Dopo due mesi mi arriva una lettera ufficiale del Servizio sanitario regionale - Ospedali riuniti di Trieste. Squallida. Segnalo nuovamente al Piccolo, che però questa volta non mi pubblica. Memore della competenza regionale della sanità scrivo una raccomandata all'**assessore Gianni Pecol Cominotto. Non ho mai avuto risposta.**

Allego copia del foglio informativo del prodotto. All'epoca il prodotto era già vietato in molti paesi: mia moglie lavorava per molti anni come informatore scientifico. E' di questi giorni un altro ciclone che ha investito questo prodotto; di questo allego un print da Google.....

*Al Pronto soccorso un disagio che si sarebbe potuto evitare con maggiore correttezza*

### Somministrati medicinali inadeguati

Sabato 6 aprile. Mio figlio, maggiorenne da poco, lamenta dei dolori a una gamba tali da farci ricorrere al pronto soccorso. Arriviamo in macchina verso le 13 a Cattinara, spieghiamo la situazione, aspettiamo fino a che arriva il nostro turno. Sulla porta dell'ambulatorio mi invitano subito a non entrare. A mio figlio vengono praticate due iniezioni e gli viene stampato il «verbale di pronto soccorso» con la prescrizione di due medicinali. Tornati in città accompagniamo mio figlio a una farmacia, aspettandolo fuori in macchina. I medicinali hanno un costo di 40,14 euro. A casa controllo i fogli contenuti nelle confezioni. Uno dei due medicinali è decisamente sconsigliato a chi assume litio. Fra gli effetti indesiderati: depressione, ridotta acutezza mentale, ansia, confusione mentale, allucinazioni, eccetera. Sono



Una veduta dell'ospedale di Cattinara.

tipici sintomi di disagi di persone che assumono il litio. Altrettanto tipicamente in certe fasi per chi assume il litio, mio figlio rifiuta di farsi cambiare il medicinale prescritto da un medico di un ospedale con uno equivalente. Lunedì 7 aprile tele-

rà lui a casa; ci sono mio figlio e mia moglie. Ma nessuno chiama, né la sera del lunedì, né di seguito.

Mi domando quanto segue. Per quale motivo il padre che accompagna un figlio all'ospedale non può entrare con lui nell'ambulatorio? A questa domanda vorrei una spiegazione, non una risposta burocratica. Se fossi stato lì quasi sicuramente avrei chiesto se i medicinali prescritti fossero compatibili con quelli assunti. Perché quel medico non ha ritenuto di sprecare una telefonata per chiarire a mio figlio il problema? Io credevo che un medico chiedesse sempre, di rubine, se il paziente assume medicinali, e quali. Allertato da me avrebbe poi dovuto intervenire. Perché non lo ha fatto? I medici che sanno di che cosa sto parlando possono capire la preoccupazione che ho in questi giorni.

Lettera firmata



Web Immagini News Maps **Novità** Gruppi **altro »**

Vioxx

Cerca

[Ricerca avanzata](#)  
[Preferenze](#)

Cerca:  il Web  pagine in Italiano  pagine provenienti da: Italia  Modifica

## Web

[vioxx.com](#) - [ [Traduci questa pagina](#) ]

Find information on the treatment of osteoarthritis symptoms and pain. For patients and professionals:

[www.vioxx.com/](http://www.vioxx.com/) - 16k - [Copia cache](#) - [Pagine simili](#)

[Cause legali per il ritiro di Vioxx dal mercato e gli effetti ...](#)

Informazioni relative al ritiro di **Vioxx** a causa di un aumento dei rischi di infarto e ictus. Contatta lo studio legale per una revisione immediata, ...

[www.ritiro-di-vioxx.com/](http://www.ritiro-di-vioxx.com/) - 32k - [Copia cache](#) - [Pagine simili](#)

[Rofecoxib - Wikipedia, the free encyclopedia](#) - [ [Traduci questa pagina](#) ]

This was largely based on the VIGOR (**Vioxx** GI Outcomes Research) study, ..... It is only with the recent development of drugs like **Vioxx** that drug companies ...

[en.wikipedia.org/wiki/Rofecoxib](http://en.wikipedia.org/wiki/Rofecoxib) - 90k - [Copia cache](#) - [Pagine simili](#)

["Vioxx avrebbe causato 28.000 infarti miocardici e morti cardiache ...](#)

infarto, miocardio, **vioxx**, farmaci, farmacovigilanza

[www.disinformazione.it/vioxx.htm](http://www.disinformazione.it/vioxx.htm) - 13k - [Copia cache](#) - [Pagine simili](#)

[Vioxx \(rofecoxib\) Information](#) - [ [Traduci questa pagina](#) ]

Please click on the following link to open web page for information on **Vioxx** and other COX-2 selective and non-selective non-steroidal anti-inflammatory ...

[www.fda.gov/cder/drug/infopage/vioxx/](http://www.fda.gov/cder/drug/infopage/vioxx/) - 9k - [Copia cache](#) - [Pagine simili](#)

[Vioxx \(rofecoxib\) Questions and Answers](#) - [ [Traduci questa pagina](#) ]

**Vioxx** is a COX-2 selective nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID). **Vioxx** is also related to the nonselective NSAIDs , such as ibuprofen and naproxen. ...

[www.fda.gov/cder/drug/infopage/vioxx/vioxxQA.htm](http://www.fda.gov/cder/drug/infopage/vioxx/vioxxQA.htm) - 35k - [Copia cache](#) - [Pagine simili](#)

[ [Altri risultati in www.fda.gov](#) ]

**"Vioxx avrebbe causato 28.000 infarti miocardici e morti cardiache ...**

infarto, miocardio, **vioxx**, farmaci, farmacovigilanza.  
[www.disinformazione.it/vioxx.htm](http://www.disinformazione.it/vioxx.htm) - 13k - [Copia cache](#) - [Pagine simili](#)

**Vioxx (rofecoxib) Information** - [ [Traduci questa pagina](#) ]

Please click on the following link to open web page for information on **Vioxx** and other COX-2 selective and non-selective non-steroidal anti-inflammatory ...  
[www.fda.gov/cder/drug/infopage/vioxx/](http://www.fda.gov/cder/drug/infopage/vioxx/) - 9k - [Copia cache](#) - [Pagine simili](#)

**Vioxx (rofecoxib) Questions and Answers** - [ [Traduci questa pagina](#) ]

**Vioxx** is a COX-2 selective nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID). **Vioxx** is also related to the nonselective NSAIDs , such as ibuprofen and naproxen. ...  
[www.fda.gov/cder/drug/infopage/vioxx/vioxxQA.htm](http://www.fda.gov/cder/drug/infopage/vioxx/vioxxQA.htm) - 35k - [Copia cache](#) - [Pagine simili](#)  
[ [Altri risultati in www.fda.gov](#) ]

**Vioxx articles, information and news** - [ [Traduci questa pagina](#) ]

(NewsTarget) A safety study of Merck's latest Cox-2 drug Arcoxia – meant to replace the painkiller **Vioxx** – found that it poses the same heart risks as an ...  
[www.newstarget.com/Vioxx.html](http://www.newstarget.com/Vioxx.html) - 41k - [Copia cache](#) - [Pagine simili](#)

**Vioxx Information from Drugs.com** - [ [Traduci questa pagina](#) ]

**Vioxx** information from Drugs.com, includes **Vioxx** side effects, interactions, indications.  
[www.drugs.com/vioxx.html](http://www.drugs.com/vioxx.html) - 43k - [Copia cache](#) - [Pagine simili](#)

**USATODAY.com - How did Vioxx debacle happen?** - [ [Traduci questa pagina](#) ]

As drugmakers scramble to grab **Vioxx's** multi-billion-dollar share of the arthritis and pain-relief market, patients might find themselves wondering whether ...  
[www.usatoday.com/news/health/2004-10-12-vioxx-cover\\_x.htm](http://www.usatoday.com/news/health/2004-10-12-vioxx-cover_x.htm) - 67k - [Copia cache](#) - [Pagine simili](#)

**VIOXX® (rofecoxib) Information Center** - [ [Traduci questa pagina](#) ]

20 Apr 2007, Texas Court Dismisses Claim of **VIOXX®** User Who Said Merck .... Merck Announces Voluntary Worldwide Withdrawal of **VIOXX®** ( [Adobe Acrobat File ...](#) )  
[www.merck.com/newsroom/vioxx/](http://www.merck.com/newsroom/vioxx/) - 60k - [Copia cache](#) - [Pagine simili](#)

## INTERAZIONI FARMACOLOGICHE E INTERAZIONI DI QUALSIASI ALTRO GENERE

Il medico deve essere informato di tutti i farmaci che si stanno assumendo o che si intende assumere, compresi quelli ottenuti senza prescrizione. Nel caso il paziente sia in terapia con i farmaci elencati di seguito, il medico può aver bisogno di controllarne l'efficacia dell'azione:

- Fluidificanti del sangue, come il warfarin ed il fluidione, poiché il medico può ritenere opportuno monitorare il tempo di protrombina (PT);
- Teofilina (un farmaco utilizzato nel trattamento dell'asma);
- Rifampicina (un antibiotico) poiché il medico può scegliere l'uso del dosaggio di 25 mg di VIOXX;
- Metotrexate (un farmaco usato per la soppressione del sistema immunitario), poiché il medico può considerare opportuno controllare la tossicità determinata dal metotrexate;
- ACE-inibitori (farmaci utilizzati per la pressione sanguigna elevata e lo scompenso cardiaco) poiché VIOXX può ridurre l'effetto degli ACE-inibitori sulla pressione arteriosa;
- Litio (un farmaco usato per alcuni tipi di depressione);
- Diuretici (farmaci che inducono la diuresi);
- Beta-bloccanti (farmaci usati per trattare la pressione del sangue elevata);
- Ciclosporina o tacrolimus (farmaci usati per la soppressione del sistema immunitario);
- Digossina (un farmaco usato per l'insufficienza cardiaca e le alterazioni del ritmo cardiaco).

VIOXX può essere assunto con basse dosi di aspirina. Se si è in cura con aspirina a bassa dose per la prevenzione di attacchi cardiaci o ictus, non si deve interrompere il trattamento senza consultare il medico (vedere PRECAUZIONI D'IMPIEGO).

Comunque, non si devono assumere farmaci antinfiammatori o dosi più elevate di aspirina mentre si assume VIOXX.

### AVVERTENZE SPECIALI

#### Effetti sulla capacità di guidare e sull'uso di macchine

Pazienti che hanno capogiro, vertigini o sonnolenza quando assumono VIOXX devono astenersi dal guidare o usare macchinari.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

### DOSAGGIO, MODO E TEMPI DI SOMMINISTRAZIONE

VIOXX può essere assunto con o senza cibo.

#### Artrosi

La dose iniziale raccomandata è di una compressa di VIOXX da 12,5 mg una volta al giorno. Alcuni pazienti possono trarre ulteriore beneficio dall'aumento del dosaggio ad una compressa di VIOXX da 25 mg una volta al giorno. Non deve essere superata la dose giornaliera di 25 mg.

#### Artrite reumatoide

La dose raccomandata è di 25 mg una volta al giorno. La dose giornaliera massima raccomandata è di 25 mg.

#### Insufficienza epatica

Nei pazienti con lieve insufficienza epatica non è necessario alcun aggiustamento del dosaggio. In pazienti con insufficienza epatica moderata (punteggio di Child-Pugh 7-9 o albumina sierica 25-35 g/l) non deve essere superato il dosaggio di 12,5 mg una volta al giorno.

Il dosaggio adeguato al paziente viene stabilito dal medico ed è importante che il paziente assuma il farmaco secondo le indicazioni del medico.

#### Sovradosaggio

In caso di sovradosaggio con VIOXX contattare immediatamente il medico. In caso di sovradosaggio, è ragionevole adottare le comuni misure di supporto; il medico può, ad esempio, rimuovere il prodotto non assorbito dal tratto gastrointestinale, controllare clinicamente il paziente e, se necessario, istituire la terapia di supporto.

### EFFETTI INDESIDERATI

Qualsiasi medicinale può avere effetti secondari o indesiderati, che vengono chiamati effetti collaterali.

Con l'uso di VIOXX sono state riportate le seguenti reazioni indesiderate sia durante gli studi che con l'uso commerciale:

### Comuni ( $\geq 1/100$ , $< 1/10$ )

**Sistema nervoso:** mal di testa, capogiro.

**Sistema vascolare:** pressione del sangue elevata.

**Apparato gastrointestinale:** bruciore e disturbi allo stomaco, diarrea, nausea e digestione difficoltosa, dolore addominale.

**Cute e annessi:** prurito.

**Disturbi generali e del sito di somministrazione:** edema/ritenzione di flu.

### Non comuni ( $\geq 1/1000$ , $< 1/100$ )

**Metabolismo e nutrizione:** aumento del peso corporeo.

**Disturbi psichiatrici:** depressione, ridotta acutezza mentale.

**Sistema nervoso:** insonnia, sonnolenza, vertigini.

**Apparato uditivo e vestibolare:** ronzii.

**Disturbi respiratori, del torace e del mediastino:** difficoltà nella respirazione.

**Apparato gastrointestinale:** stitichezza, ulcera orale, vomito, sintomi digestivi connessi alla presenza di gas, reflusso acido, distensione addominale.

**Cute e annessi:** eruzione cutanea e dermatite allergica.

**Apparato muscoloscheletrico, tessuto connettivo e tessuto osseo:** crampi muscolari.

**Disturbi generali e del sito di somministrazione:** astenia/faticabilità, dolore toracico.

### Rara ( $\geq 1/10.000$ , $< 1/1000$ )

**Apparato gastrointestinale:** infiammazione della parete dello stomaco, ulcere dello stomaco che possono diventare serie, perforarsi e sanguinare.

### Molto rara ( $< 1/10.000$ )

**Sistema immunitario:** reazioni allergiche (che possono essere seriate da richiedere l'immediata attenzione del medico), inclusi broncospasmo, orticaria e gonfiore del viso, delle labbra, della lingua e/o gola, che possono causare difficoltà nella respirazione o nella deglutizione; reazioni anafilattiche o anafilattoidi ed infiammazione allergica dei sanguigni.

**Disturbi psichiatrici:** ansia, confusione mentale, allucinazioni.

**Sistema nervoso:** formicolio.

**Disturbi uditivi:** visione offuscata.

**Disturbi cardiaci:** insufficienza cardiaca congestizia.

**Apparato gastrointestinale:** aggravamento della malattia infiammatoria dell'intestino.

**Sistema epatobiliare:** epatotossicità inclusa epatite con o senza (ingiallimento di cute e mucose).

**Cute e annessi:** caduta dei capelli, reazioni allergiche della pelle causate dall'esposizione alla luce del sole.

**Sistema urinario:** seri problemi renali.

### Casi isolati

Una non comune forma di mal di testa con irrigidimento del collo (menorrea), gravi reazioni della pelle, insufficienza epatica (vedere PRECAUZIONI D'IMPIEGO), una malattia infiammatoria del rene (nefrite interstiziale), infarto del miocardio (non è stata accertata una relazione causale). Negli studi clinici, il profilo delle esperienze indesiderate è risultato in pazienti trattati con VIOXX per un anno o più a lungo.

### Esperienze indesiderate di laboratorio

**Comuni ( $\geq 1/100$ ,  $< 1/10$ ):** alterazione di alcuni indicatori di funzione epatica (incremento della alanina aminotransferasi (GPT), aspartato aminotransferasi (GOT)), alterazione di alcuni parametri ematici (riduzione dell'ematocrito).

**Non comuni ( $\geq 1/1000$ ,  $< 1/100$ ):** alterazione di alcuni indicatori di funzionalità epatica e renale (incremento della fosfatasi alcalina, azoto creatinina sierica), eccesso di proteine nelle urine (proteinuria), riduzione di alcuni parametri ematologici (globuli rossi, emoglobina, globuli bianchi).

**Molto rare ( $< 1/10.000$ ):** riduzione del numero delle piastrine, aumento del potassio nel sangue.

Si invita il paziente a comunicare al proprio medico la comparsa di qualsiasi effetto indesiderato diverso da quelli sopra riportati.

**ATTENZIONE: NON UTILIZZARE IL MEDICINALE DOPO LA DATA DI SCADENZA INDICATA SULLA CONFEZIONE**

Data dell'ultima revisione da parte del Ministero della Sanità: Luglio 2002

79651/01

**VIOXX® 12,5 mg compresse**  
**VIOXX® 25 mg compresse**  
 ATC: M01AH02  
 (Rofecoxib)

Informazioni complete per la prescrizione sono riportate sulla scheda tecnica del prodotto, disponibile a medici e farmacisti.

**COMPOSIZIONE**

Ogni compressa di VIOXX® 12,5 mg contiene:

*principio attivo:* 12,5 mg di rofecoxib;

*eccipienti:* lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, Idrossipropilcellulosa, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, E172 ferro ossido giallo.

Ogni compressa di VIOXX® 25 mg contiene:

*principio attivo:* 25 mg di rofecoxib;

*eccipienti:* lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, Idrossipropilcellulosa, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, E172 ferro ossido giallo.

**FORMA FARMACEUTICA**

VIOXX 12,5 mg compresse: 14 e 20 compresse da 12,5 mg.

VIOXX 25 mg compresse: 14 e 20 compresse da 25 mg.

**CATEGORIA FARMACO-TERAPEUTICA**

VIOXX è un inibitore selettivo della cicloossigenasi 2 (COX-2).

**TITOLARE AUTORIZZAZIONE ALLA IMMISSIONE IN COMMERCIO**

MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.p.A.

Via G. Fabbroni, 6 - 00191 Roma

Consociata della Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, N.J., U.S.A.

**PRODUZIONE**

- Merck Manufacturing Division

Arecibo, Puerto Rico

- Merck Sharp & Dohme (Australia) PTY Ltd.

South Granville, Australia

- Merck Sharp & Dohme Ltd.

Cramlington, Regno Unito

**CONFEZIONAMENTO**

- Merck Sharp & Dohme (Australia) PTY Ltd.

South Granville, Australia

- Merck Sharp & Dohme B.V.

Haarlem, Olanda

- Merck Sharp & Dohme Ltd.

Cramlington, Regno Unito

**CONTROLLATO DA**

- Merck Sharp & Dohme B.V.

Haarlem, Olanda

**INDICAZIONI**

VIOXX è indicato per il sollievo sintomatico nel trattamento dell'artrosi o dell'artrite reumatoide nell'adulto.

**CONTROINDICAZIONI**

VIOXX non deve essere usato:

- in pazienti con ipersensibilità nota a qualsiasi componente del prodotto;
- in pazienti con ulcera peptica attiva o sanguinamento gastrointestinale;
- in pazienti con disfunzione epatica grave (punteggio di Child-Pugh >9);
- in pazienti con grave malattia renale (clearance stimata della creatinina <30 ml/min);
- in pazienti che dopo la somministrazione di aspirina o altri farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) hanno sviluppato segni di asma (sibili o difficoltà respiratoria), rinite acuta, polipi nasali, o sintomi allergici quali gonfiore del viso, delle labbra, della lingua o della gola, e/o eruzione cutanea pruriginosa;

- nel terzo trimestre di gravidanza o durante l'allattamento (vedere PRECAUZIONI D'IMPIEGO - *Gravidanza e allattamento*);
- in pazienti con malattie infiammatorie dell'intestino;
- in pazienti con grave scompenso cardiaco congestizio.

**PRECAUZIONI D'IMPIEGO**

Informare il medico su qualsiasi malattia o problema medico e su qualsiasi allergia, presente al momento o avuta in passato, in particolar modo è importante informare il medico in caso di: insufficienza cardiaca o qualsiasi altra forma di malattia cardiaca, pressione sanguigna elevata, edemi persistenti (gonfiore dovuto a ritenzione di liquidi), disfunzioni renali, disfunzioni epatiche.

È importante che il medico sappia se il paziente è disidratato come, per esempio, dopo un periodo prolungato di malattia o dopo ripetuti episodi di vomito o diarrea.

VIOXX può mascherare la febbre che è un segno d'infezione. Il medico deve essere avvisato se il paziente è in terapia per un'infezione.

Se il paziente è affetto da malattie del reni, del fegato o del cuore, il medico può richiedere un periodico controllo del paziente.

VIOXX non sostituisce l'aspirina nella prevenzione cardiovascolare poiché non ha effetto sulla plastrina (vedere INTERAZIONI FARMACOLOGICHE E INTERAZIONI DI QUALSIASI ALTRO GENERE).

Durante gli studi su VIOXX si sono verificate ulcere dello stomaco.

Alcune persone possono sviluppare ulcere, ma il rischio con VIOXX è inferiore rispetto a quello con FANS. Indipendentemente dal trattamento, i pazienti che hanno avuto in passato tali patologie o che hanno più di 65 anni, sono risultati a rischio più elevato.

Se il paziente sviluppa sintomi che possono indicare problemi epatici, come ingiallimento della cute e dell'occhio, è importante contattare il medico prima possibile.

Consultare urgentemente un medico nel caso in cui si manifesti un dolore addominale forte o persistente e/o le feci diventino nere.

In caso di intolleranza al lattosio informarne il medico. Ciascuna compressa di VIOXX da 12,5 mg e da 25 mg contiene rispettivamente 39,95 mg e 79,34 mg di lattosio. È probabile che queste quantità siano insufficienti per indurre sintomi specifici di intolleranza al lattosio.

**Gravidanza**

In caso di gravidanza in atto, se si ritiene possibile essere in stato di gravidanza o se si intende programmare una gravidanza, bisogna consultare il medico prima di assumere VIOXX. VIOXX non deve essere usato durante i primi sei mesi della gravidanza a meno che il medico curante non ritenga che ci siano ragioni che ne impongano l'uso. VIOXX non deve essere assunto durante gli ultimi tre mesi della gravidanza poiché può causare danno al feto (vedere CONTROINDICAZIONI).

**Allattamento**

Non è noto se questo farmaco venga escreto nel latte umano. Se si sta allattando o si intende farlo, consultare il proprio medico prima di assumere VIOXX. Se si sta utilizzando VIOXX non si deve allattare (vedere CONTROINDICAZIONI).

**Età pediatrica**

VIOXX non è stato studiato nei bambini e deve essere utilizzato solo in pazienti adulti.

**Uso nell'anziano**

VIOXX è egualmente efficace ed è ugualmente ben tollerato nei pazienti anziani e nei giovani.

Non è richiesto aggiustamento del dosaggio nell'anziano. È possibile che il medico ritenga necessario tenere sotto osservazione i pazienti anziani in trattamento con VIOXX.

**DIREZIONE GENERALE**  
Dipartimento di Staff  
Ufficio Rapporti con il Pubblico

PROT. N. 2493/R8/03

Trieste, 17/6/2003

Funzionario Responsabile  
Del procedimento:  
M. Danieli 

Estensore:   
L. Zaccaria

**Al Signor**  
**Mario COMUZZI**  
**Via del Carpineto, 12**  
**34100 Trieste**

Oggetto: segnalazione su "IL PICCOLO" dd. 15/04/2003

Gentile Signore,

con riferimento alla Sua segnalazione pubblicata sul quotidiano locale, questa Amministrazione ha svolto un'indagine interna per risalire ai fatti da Lei esposti.

Sentiti il Responsabile medico della S. C. Pronto Soccorso di Cattinara ed il medico di turno che il giorno 05/04/03 alle ore 14.27 ha visitato Suo figlio, si comunica quanto segue:

❖ a Suo figlio spettano tutti i diritti del cittadino in maggiore età, capace di intendere e di volere.

Al momento della visita medica, visto che sembrava orientato e collaborante, non c'era la necessità della presenza di un tutore e tantomeno Suo figlio, ha richiesto l'assistenza di un parente.

Tale visita medica, considerata privata, rientra nella "Legge della privacy".

❖ Riguardo alla "incompatibilità" dei farmaci, probabilmente è stato un problema di "interpretazione" della scheda informativa e nel Suo caso, per tutti i suoi dubbi, avrebbe potuto contattare il medico di base, che nella giornata del lunedì (giorno in cui Lei ha telefonato al Pronto Soccorso) dovrebbe essere stato reperibile.

Cordiali saluti

"PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE"  
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF  
ANNUNZIATO MINNITI



**Gianni Pecol Cominotto**  
Assessore regionale alla Sanità e alle Politiche sociali  
Riva Nazario Sauro 8, I piano  
34124 Trieste

**RRR**

**Trieste, 28/07/03**

**Egregio signor Gianni Pecol Cominotto, assessore alla sanità.**

**Martedì 15 Aprile Il Piccolo ha pubblicato con risalto (IL CASO, con una foto dell'ospedale di Cattinara) la mia segnalazione sul caso di mio figlio titolandola "Somministrati medicinali inadeguati" (allego fotocopia).**

**In realtà si trattava di medicinali assolutamente controindicati.**

**Dopo due mesi e mezzo ho ricevuto una risposta intestata nientemeno che:**

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - AZIENDA OSPEDALIERA - 'OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE' Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione, DIREZIONE GENERALE - Dipartimento di Staff - Ufficio Rapporti con il Pubblico!**

**E dunque la risposta è a nome del medico, del suo responsabile di reparto, del direttore sanitario, della direzione generale.**

**E' una risposta squallida. Mio figlio, che stando alle prescrizioni citate ha assunto quel farmaco per una settimana, dopo qualche settimana ha dovuto abbandonare il lavoro per un grave peggioramento e tuttora non lo ha ripreso. Telefonando al reparto in questione, avevo chiesto aiuto perchè non potevo io correggere la situazione: "Te vol saver più del dottor dell'ospedale?" Soprattutto tenendo conto del tipo di problemi. E questo lo avevo spiegato anche nella segnalazione.**

**Problema di interpretazione della scheda informativa? Ma allora sono di una incompetenza totale e pericolosa! Allego fotocopia.**

**Io sono schifato dall'irresponsabilità e dal cinismo dell'intera struttura. Nessuno di loro ha realizzato il concetto che vengono arrecati danni alla salute di mio figlio. Non parlo di etica perchè apparteniamo a galassie diverse. Ma in nessuna azienda seria si perdonerebbe ai suoi dipendenti e tanto meno ai suoi dirigenti un simile comportamento.**

**Sono convinto che lei, assessore alla sanità, non potrà fare a meno di dimostrare il suo interesse per il caso che le sottopongo, che fa crollare totalmente la fiducia nella nostra azienda sanitaria.**

**Mario Comuzzi**

**PS In tutti i casi vi prego di contattare direttamente me, non mio figlio a cui vanno evitati motivi di stress di ogni tipo.**